


۶۷



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی قزوین  
دانشکده دندانپزشکی

**پایان نامه**  
**جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی**

**موضوع**  
**بررسی شیوع هیپوپلازی دندانهای شیری کودکان**  
**(۳-۶) ساله در مهدکودکهای شهر قزوین**

به راهنمایی استاد گرانقدر:  
سرکار خانم دکتر فاطمه ملاسعدالله

تهیه و تنظیم:  
جواد البرز آشتیانی

سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹  
شماره پایان نامه: ۱۵۰

هدف از این مطالعه بررسی شیوع هیپوپلازی دندانهای شیری کودکان (۶-۳) ساله بود. در این مطالعه حدود ۴۰۰ کودک بصورت تصادفی از مهد کودکهای شهر قزوین انتخاب شدند. در جمعیت مورد مطالعه این تحقیق که کودکان ۶-۳ ساله مهد کودکهای شهر قزوین هستند میزان شیوع هیپوپلازی ۲۷/۱ درصد بدست آمد که در این بین شیوع هیپوپلازی در دندانهای قدامی کودکان ۳۳/۷ درصد و این میزان در دندانهای خلفی ۱۸/۸ درصد بود. به عبارت دیگر میزان شیوع در دندانهای قدامی تقریباً دو برابر دندانها خلفی بدست آمد.

بیشترین شیوع هیپوپلازی را ناحیه راست فک بالا داشت (۷۷/۴ درصد سمت راست فک بالا در مقابل ۶۵/۹ درصد سمت چپ فک بالا. در مطالعه حاضر میزان شیوع هیپوپلازی در پسرها بیشتر از دخترها بدست آمد (پسرها ۴۲/۱ درصد در مقابل ۳۱/۴ درصد در دخترها). میزان شیوع هیپوپلازی در کودکانی که با وزن هنگام تولد کمتر از ۲۰۰۰ گرم بدنیا آمده اند حدود ۶۰ درصد است. در نوزادانی که تولدشان در ۹ ماهگی بوده شیوع هیپوپلازی ۳۵/۸ درصد بدست آمد در حالی که در نوزادانی که به طور نارس متولد شده اند ۶۲/۹۷ درصد شیوع هیپوپلازی مشاهده شده است. شیوع ۳۵/۶ درصد در کودکان سالم در مقایسه با شیوع ۴۴/۸ درصد در کودکان دارای بیماری بود. میزان شیوع هیپوپلازی در کودکانی با والدینی که سطح تحصیلات بالاتری داشتند به مراتب کمتر بود. با ارتقاء سطح بهداشت جامعه، از طریق برنامه های جامع با افزایش آگاهی - سطح فرهنگ و اقتصاد بطور همه جانبه و عام شاید بتوان گامی مؤثر در جلوگیری از بروز بسیاری بیماریها و بالاخص ایجاد این ضایعه دندانی برداشت.